

Angst voor de tandheelkundige behandeling

Respondenten werd gevraagd of zij bang waren voor de tandarts. In tabel 4.9 staan de resultaten weergegeven.

Tabel 4.9 Percentage respondenten die helemaal niet bang waren voor de tandarts, naar SES en leeftijd, en p-waarde van Pearson Chi-kwadraattoets (p) op SES-verschillen.

	25-34 jaar	35-44 jaar	45-54 jaar	55-64 jaar	65-74 jaar
Krachtwijken	40	47	54	48	53
DB-laag	42	46	44	59	59
DB-hoog	66	62	66	61	62
p	<0,01	ns	<0,01	ns	ns

Uit Tabel 4.9 blijkt dat vooral mensen uit de hogere SES-groep minder bang voor de tandarts waren, althans in de drie lagere leeftijdscategorieën.

Angst voor de tandheelkundige behandeling werd tevens gemeten door middel van de Dental Anxiety Scale (DAS). Het bereik van de DAS loopt van 4 (totaal niet angstig) tot 20 (extreem angstig). Een score van >12 wordt als klinisch relevant beschouwd. In Tabel 4.10 worden de resultaten gepresenteerd.

Tabel 4.10 Percentage respondenten die een score >12 op de DAS hadden, naar SES en leeftijd, en p-waarde van Pearson Chi-kwadraattoets (p) op SES-verschillen.

	25-34 jaar	35-44 jaar	45-54 jaar	55-64 jaar	65-74 jaar
Krachtwijken	11	15	16	9	10
DB-laag	18	8	11	8	7
DB-hoog	7	7	4	5	4
p	ns	ns	<0,01	ns	ns

Ook uit Tabel 4.10 blijkt dat de hoge SES-groep over het algemeen het minst angstig was voor de tandheelkundige behandeling.